



Nome:

BAYCOX 5% suspensão oral.

Princípio Activo:

Toltrazuril.

Grupo Farmacoterapêutico:

Anti-protozoários.

Composição Qualitativa e Quantitativa:

1 ml contém: Toltrazuril 50 mg.

Forma Farmacêutica:

Suspensão oral.

Espécies Animais Alvo:

Suínos (leitões).

Indicações Terapêuticas:

Prevenção dos sinais clínicos de coccidiose em leitões recém-nascidos, em explorações com história clínica confirmada de coccidiose causada por *Isospora suis*.

Contra-indicações:

Desconhecidas.

Efeitos Indesejáveis:

Desconhecidos.

Posologia, Modo e Via de Administração:

Tratamento individual.

Cada leitão deve ser tratado aos 3-5 dias de idade com uma dose oral única de 20 mg de toltrazuril/kg peso vivo, equivalente a 0,4 ml de suspensão oral por kg p.v..

Devido aos pequenos volumes necessários para o tratamento individual dos leitões, recomenda-se a utilização de um equipamento doseador com precisão de dosagem de 0,1 ml.

Agitar a suspensão oral antes de a utilizar.

Durante um surto da doença o tratamento individual de leitões apresenta um valor limitado, uma vez que já ocorreram lesões no intestino delgado.

Precauções Especiais de Utilização

Desconhecidas.

Interações Medicamentosas e Outras:

Desconhecidas; por exemplo, não existem interações associadas à administração de suplementos de ferro.

Utilização em Caso de Gestação e Lactação:

Não aplicável.

Sobredosagem (Sintomas, Medidas de Urgência, Antídotos):

Uma sobredosagem com doses 3 vezes superiores à dose recomendada foi bem tolerada por leitões saudáveis, sem sinais de intolerância.

Advertências Especiais para Cada Espécie Animal Alvo:

Nenhumas.

Baycox® 5%

Suspensão oral



Intervalo de Segurança:

Carne e vísceras: 77 dias.

Precauções Especiais a Adotar pela Pessoa que Administra o Medicamento aos Animais:

Lavar imediatamente com água qualquer derrame acidental sobre a pele ou olhos.

Incompatibilidades:

Desconhecidas.

Condições de Conservação:

Não são necessárias precauções especiais de conservação.

Prazo de validade após a primeira abertura da embalagem: 3 meses.

Apresentações:

Frascos contendo 100, 250 ou 1000 ml.

Algumas apresentações poderão não ser comercializadas.

Só pode ser vendido mediante receita médica-veterinária.

N.º e data da AIM:

51428 no INFARMED; 04-12-2002