

**Nome:**

BAYOFLY pour-on.

Princípio Activo:

Ciflutrina.

Grupo Farmacoterapêutico:

Ectoparasiticidas, insecticidas e repelentes.

Composição Qualitativa e Quantitativa:

Cada ml contém: Ciflutrina 10 mg

Forma Farmacêutica:

Solução para unção contínua.

Espécies Animais Alvo:

Bovina.

Indicações Terapêuticas:

Tratamento de infestações provocadas por muscídios e tabanídeos, nomeadamente: *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea spp.*, *Haemaopota spp.*

Contra-indicações:

Não utilizar em animais com hipersensibilidade conhecida à substância activa.

Não utilizar o medicamento em vitelos.

Efeitos Indesejáveis:

À semelhança do que se verifica com outros piretróides, podem ocorrer ocasionalmente manifestações de agitação de natureza transitória.

Posologia, Modo e Via de Administração:**DOSAGEM:**

10 ml por animal.

MODO DE APLICAÇÃO:

Bayofly Pour-on é uma solução pronta a utilizar que se aplica sobre o dorso dos animais.

A aplicação pode ser repetida após 4 - 6 semanas, dependendo da intensidade da reinfestação.

O produto deverá ser aplicado apenas em zonas de pele íntegra.

As vacas em produção deverão ser tratadas logo após a ordenha.

Precauções Especiais de Utilização

Não são necessárias.

Bayofly® Pour-on**Interações Medicamentosas e Outras:**

Não são conhecidas.

Utilização em Caso de Gestação e Lactação:

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

Sobredosagem (Sintomas, Medidas de Urgência, Antídotos):

À semelhança do que se verifica com outros piretróides, a sobredosagem com Bayofly Pour-on pode provocar manifestações passageiras de irritação e agitação, nomeadamente movimentos da cauda e lambar dos flancos.

No caso de ingestão recorrer de imediato ao médico para tratamento sintomático.

Os sinais de intoxicação são parestesia, salivação, tremor ou hipercinese.

Não se conhece antídoto específico.

Advertências Especiais para Cada Espécie Animal Alvo:

Não se conhecem.

Intervalo de Segurança:

Tecidos edíveis: zero dias.

Leite: zero dias.

Precauções Particulares a Tomar pela Pessoa que Administra o Medicamento aos Animais:

As pessoas com hipersensibilidade conhecida à substância activa devem evitar o contacto com o medicamento veterinário.

Deve evitar-se o contacto com a pele e as mucosas. Deve ser usado equipamento de protecção individual constituído por luvas de protecção durante a utilização do medicamento veterinário.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com água e sabão. Os olhos deverão ser de imediato lavados com água.

Incompatibilidades:

Não são conhecidas.

Condições de Conservação:

Não armazenar a temperatura inferior a 8°C. O produto não deverá ser armazenado à luz solar directa.

Apresentações:

Frascos de 250 ml e de 500 ml.

Algumas apresentações poderão não ser comercializadas.

Só pode ser vendido mediante receita médica-veterinária.

N.º e data da AIM:

51314 no INFARMED; 25-02-2000.